

Les Cremades

Segons el grau de lesió que produeixen en la pell i en els teixits, les cremades es classifiquen en tres graus:

Primer grau: s'enrogeix la part externa de la pell (epidermis) i es produeix una lleugera inflamació, enrogiment, picor i dolor.

Segon grau: la part interior de la pell (dermis) es crema i s'hi formen bombolles.

Tercer grau: la pell es calcina per complet i es lesionen els teixits que es troben davall, i s'arriben a destruir els músculs i altres estructures.

La gravetat d'una cremada depèn més de la seva extensió que del seu grau. Una cremada de primer grau però molt extensa es considera més greu que una de tercer grau més localitzada.

Com cal procedir fins que la cremada siga atesa per un metge?

Si la cremada és de primer grau i poc extensa, cosa freqüent a l'estiu, el millor és aplicar fred durant una estona sobre la zona i després una pomada per a cremades.

Si la cremada és més seriosa:

- No rebentar les bombolles que s'hagin format
- Netejar amb aigua freda i sabó
- No aplicar antisèptics ni cremes ni pols ni antibiòtics
- Tapar la zona amb gases i benes
- Portar el cremat a un centre sanitari

En cas de cremades greus i extenses cal sol·licitar una ambulància medicalitzada i fins que no arribi cal cobrir el cremat.

